

# CRESIF INFO'Doc

## Tabac

Bulletin de veille de ressources francophones sur Internet



### {PERIODIQUE}

Institut de veille sanitaire - InVS

#### **Numéro thématique - Journée mondiale sans tabac 2008**

Bulletin épidémiologique hebdomadaire - BEH thématique 21-22 / 27 mai 2008

[http://www.invs.sante.fr/beh/2008/21\\_22/beh\\_21\\_22\\_2008.pdf](http://www.invs.sante.fr/beh/2008/21_22/beh_21_22_2008.pdf)

Le tabac est aujourd'hui dans le monde la cause de mortalité la plus évitable. Cette année, le tabac tuera plus de 5 millions de personnes - plus que la tuberculose, le VIH/sida et la malaria combinés. De nos jours, la moitié des fumeurs, soit environ 650 millions, mourront éventuellement de leur tabagisme. La consommation de tabac est un facteur de risque pour six des huit causes majeures de mortalité dans le monde. A moins de prendre d'urgence des mesures, plus d'un milliard de personnes pourraient être victimes du tabac au cours de ce siècle. L'usage du tabac cause également des préjudices économiques aux familles et aux pays : perte de salaire, diminution de la productivité et augmentation du coût des soins médicaux.

p. 181 Éditorial - Contrer l'épidémie mondiale de tabagisme

p. 183 Évaluation des politiques de lutte contre le tabagisme en France : résultats de la première vague de l'enquête ITC France

p. 187 Le tabagisme des adolescents suite à l'interdiction de vente aux mineurs de moins de 16 ans en France

p. 190 SimSmoke France : description d'un modèle de simulation des politiques de lutte contre le tabac

p. 194 Bénéfices de l'arrêt du tabac

p. 198 Avancées du contrôle du tabac dans 30 pays européens, de 2005 à 2007

p. 201 Les avertissements sanitaires apposés sur les paquets de cigarettes : quelle efficacité dans la lutte contre le tabagisme ?

### {DOSSIER DE PRESSE}

INPES

#### **31 mai 2008. Journée Mondiale sans Tabac. Accompagner ceux qui veulent en finir avec le tabac.**

<http://www.inpes.sante.fr/70000/dp/08/dp080529.pdf>

Ce dossier présente le dispositif de communication de la nouvelle campagne tabac de l'INPES. Cette nouvelle campagne apporte des informations sur le processus de sevrage, notamment en le dédramatisant, afin d'inciter à l'arrêt du tabac. Pour motiver les fumeurs, les messages délivrés démontrent que si l'abandon du tabac comporte des difficultés, il n'est pas insurmontable à condition d'y être bien préparé et d'en connaître tous les pièges. Dans le même temps, la campagne a pour objectif de promouvoir Tabac Info Service, dispositif d'information et d'aide à l'arrêt du tabac accessible par téléphone où des conseillers et des tabacologues répondent aux questions des personnes qui souhaitent arrêter, leur délivrent de la documentation, les conseillent et les accompagnent, si elles le souhaitent, dans leur démarche d'arrêt.

**{SYNTHESE}**

OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies)

**Tabagisme et arrêt du tabac en 2007 : tableau de bord mensuel des indicateurs tabac, bilan de l'année 2007**

[http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt\\_07bil.pdf](http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_07bil.pdf)

Cette synthèse effectue un bilan pour l'année 2007 de l'évolution des données françaises concernant le tabac : ventes de cigarettes, ventes de substituts nicotiniques, activité des consultations de tabacologie, dispositifs d'écoute et campagnes de prévention gouvernementales.

**{RAPPORT}**

OFT (Office Français de prévention du Tabagisme) ; Union européenne

**Mesures du monoxyde de carbone lors de l'exposition à la fumée de tabac : enquête effectuée auprès de 111835 fumeurs et non-fumeurs dans les 27 pays de l'Union européenne**

[http://www.gouvernement.lu/salle\\_presse/actualite/2007/10/23-dibartolomoe-campagne/rapport.pdf](http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2007/10/23-dibartolomoe-campagne/rapport.pdf)

Ce document présente les résultats d'une enquête réalisée en mars 2006 dans les vingt-sept Etats membres de l'Union européenne, auprès de fumeurs comme de non-fumeurs afin de mesurer le taux de monoxyde de carbone exhalé par les uns et les autres et d'évaluer l'effet de certaines mesures de lutte contre le tabac.

**{ARTICLE}**

INPES

**Le tabagisme passif favoriserait le diabète**

In *Tabac actualités*, n° 88, mai 2008, pp. 4-5

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu88.pdf>

Si un lien entre diabète et tabagisme actif est aujourd'hui établi, il n'en allait pas de même pour le tabagisme passif : le risque de développer un diabète, pour les personnes exposées à la fumée du tabac des autres, n'a été que peu exploré, puisqu'on ne connaît qu'une seule étude montrant une association significative entre tabagisme passif et trouble de la tolérance au glucose

**FEMMES****{RAPPORT}**

HERSZKOWICZ A, dir. ; LEPORC E.

**La prévention du tabagisme féminin en Ile-de-France**

GRSP (Groupement Régional de Santé Publique d'Ile-de-France) ; CRAMIF (Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France, mars 2008 ; 45 p.

<http://www.grsp-idf.fr/pdf/prevention-tabagisme-feminin-ile-de-france.pdf>

Ce rapport rend compte d'une étude réalisée par entretiens auprès d'intervenants ayant mis en place des actions de prévention du tabagisme auprès de femmes en Ile-de-France (foyers, milieu scolaire, écoles sanitaires et sociales, PMI). L'objectif de ce travail était d'identifier les obstacles et les limites de ces programmes et de proposer des pistes d'action.

**{ARTICLE}**

Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé (INPES)

**Tabagisme pendant la grossesse : une influence sur le caractère de l'enfant ?**

In *Tabac actualités*, n° 88, mai 2008, p. 6

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu88.pdf>

Le tabagisme maternel durant la grossesse serait associé chez le futur enfant à une augmentation du risque de problèmes comportementaux : comportements antisociaux, tabagisme et abus de substances psychoactives. L'origine de cette corrélation reste sujet à discussion.

**{ETUDE}**

DAUTZENBERG, Bertrand

**Les cigarettes parfumées - Enquête PST 2007-2008 Pour l'action européenne ACTIF Premiers résultats**

[http://emage.prosygma.com/repupload/upload-actif/21%20mai%202008/cig\\_parfumee\\_enquete\\_2008.pdf](http://emage.prosygma.com/repupload/upload-actif/21%20mai%202008/cig_parfumee_enquete_2008.pdf)

Dans le cadre d'une action Européenne «travailler avec les communautés», pilotée en France par l'Alliance Contre le Tabac en Ile-de-France (Actif), un premier questionnaire a été diffusé auprès des collégiens lors d'interventions effectuées par Paris Sans Tabac ou par les infirmières scolaires en fin 2007 et janvier 2008. 65,9 % des collégiens ont déjà essayé des cigarettes parfumées. Ils sont nombreux à penser que ces cigarettes sont moins dangereuses que les autres.

**{ETAT DES LIEUX}**

BLANC-LEPONNER G, PELOSSE L, Réseau éducation santé Rhône-Alpes.

**État des lieux de la prévention du tabagisme auprès des jeunes en Rhône-Alpes : Comparaison entre 2004 et 2006.**

Lyon : CRAES-CRIPS, 2007, 27 p.

[http://www.craes-crips.org/publications/2007/prevention\\_tabac\\_jeunes.pdf](http://www.craes-crips.org/publications/2007/prevention_tabac_jeunes.pdf)

Ces états des lieux ont été réalisés dans le cadre du programme régional de prévention du tabagisme auprès des jeunes porté par le réseau rhônalpin d'éducation pour la santé, en partenariat avec l'Institut Rhône-Alpes de Tabacologie, et financé par l'INPES pour les années 2004-2006. Ils ont pour objectif de réaliser :

- un diagnostic initial (en 2004) sur la concertation, les pratiques et la formation des acteurs de ce champ, afin d'adapter les actions aux besoins des professionnels concernés
- un second diagnostic (en 2006) pour repérer les évolutions du champ de la prévention du tabagisme et les besoins éventuels

**{MANUEL}**

CRES (Comité Régional d'Education pour la Santé), Franche-Comté

**Repères pour une démarche lycée sans tabac : fiches techniques**

CRES Franche-Comté, mars 2007, 39 p.

[http://www.urcam.org/fileadmin/FRANCHE-COMTE/partenaires/cres/Reperes\\_lycees\\_sans\\_tabac.pdf](http://www.urcam.org/fileadmin/FRANCHE-COMTE/partenaires/cres/Reperes_lycees_sans_tabac.pdf)

Résumé : Basé sur des expériences de terrain, ce guide a pour objectif d'aider les équipes éducatives à mettre en oeuvre une démarche de lycée sans tabac. Il se décline en treize fiches pratiques : caractériser l'établissement, visualiser les indicateurs, communiquer, constituer un groupe de pilotage, identifier les problématiques, former à la démarche, connaître les lois, mener un groupe de motivation, décliner des actions éducatives, concevoir un programme pour la Journée mondiale, évaluer, travailler en partenariat, organiser des temps d'échanges.

**{ARTICLE}**

Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé (INPES)

**Consultation de tabacologie : pour les sujets les plus dépendants**

In *Tabac actualités*, n° 88, mai 2008, p. 6

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu87.pdf>

La grande majorité des fumeurs désirant arrêter de fumer relève d'une prise en charge par le seul médecin traitant. Selon les données du Baromètre santé médecins/ pharmaciens 2003, corroborées par celles d'une étude de pratique réalisée dans la Marne, la quasi-totalité (97,8 %) des omnipraticiens les traitent eux-mêmes, soit seuls (86,5 % des cas), soit en liaison avec une structure (11,3 %) ; les médecins généralistes ne les confient directement à une consultation de tabacologie que dans 2,2 % des cas. Quels sont donc les fumeurs qui doivent recourir aux consultations spécialisées de tabacologie ?

**{ARTICLE}**

Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé (INPES)

Donner à un fumeur son « âge pulmonaire » encourage le sevrage

In *Tabac actualités*, n° 88, mai 2008, pp. 4-5

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu87.pdf>

La mesure du souffle permet d'évaluer « l'âge pulmonaire » d'une personne donnée. Il se calcule simplement à partir de la mesure du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS), paramètre utilisé en pneumologie pour évaluer la fonction respiratoire, notamment en cas d'asthme ou de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Le concept d'âge pulmonaire a été développé dans les années 1985. L'objectif est de placer le patient face à la réalité d'un âge pulmonaire qui, dans certains cas, peut être supérieur à son âge chronologique. Cette visualisation est réalisée grâce à l'utilisation du schéma de Fletcher et Peto (encadré).

Bulletin électronique en ligne sur [www.cresif.org](http://www.cresif.org) - Abonnement gratuit [cresif@wanadoo.fr](mailto:cresif@wanadoo.fr)

[www.cresif.org](http://www.cresif.org)  
[www.prosante-if.org](http://www.prosante-if.org)  
ressource documentaire en promotion  
de la santé Ile-de-France

Comité Régional d'Éducation pour la Santé d'Ile-de-France

14 rue La Fayette  
75009 Paris  
Tél. : 01 48 24 38 00 / Tél. doc. : 01 48 24 38 02  
Fax : 01 48 24 38 01 / E-mail : [cresif@wanadoo.fr](mailto:cresif@wanadoo.fr)