

## {PERIODIQUE}

MELIHAN CHENIN, Pascal; JOSSERAN, Loïc

**Numéro thématique: Journée Mondiale sans Tabac 2007** In Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), n° 21, 29 mai 2007, 12 p.

[http://www.invs.sante.fr/beh/2007/21/beh\\_21\\_2007.pdf](http://www.invs.sante.fr/beh/2007/21/beh_21_2007.pdf)

*Ce numéro du BEH était consacré à la lutte contre le tabagisme, à l'occasion de la Journée Mondiale sans Tabac 2007, consacrée cette année aux espaces sans tabac. Un premier article fait le point sur l'évolution du nombre de lycées non-fumeurs. Un article aborde le bilan de l'application de la loi Evin dans les hôpitaux français. Ce numéro évoque également la chicha, dont la consommation est en augmentation parmi les jeunes Français, souvent peu conscients de sa toxicité. Le numéro spécial se clôt sur les résultats d'une enquête sur l'évolution du tabagisme en milieu professionnel de janvier à mars 2007, suite à l'entrée en vigueur début février du décret.*

## {ACTES}

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES)

**Prévention du tabagisme: agir au plus près des populations.** Vendredi 8 décembre 2006, Ministère de la Santé et des Solidarités, 89 p.

<http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=10000/themes/tabac/colloque2007.htm>

*L'INPES présente sur son site internet les actes de ce colloque, qui s'est déroulé le 8 décembre 2006 à Paris, et a rassemblé près de 200 participants.*

*Au sommaire:*

- *Les actions de proximité, maillons incontournables d'une politique globale de prévention du tabagisme*
- *L'évolution des lois et les actions de proximité*
- *Table ronde: comment asseoir les projets sur de bonnes bases: l'implantation des actions de proximité (retour sur le dispositif « Emploi jeunes Tabac », l'Ecole du souffle et la prévention en entreprise, le programme Liber'tabac mené en milieu scolaire, « Bien-être, liberté de choix et santé », programme pluri-annuel mené en Moselle auprès de femmes précaires hébergées en foyers)*
- *Table ronde: comment faire vivre une action de terrain au quotidien: le déroulement des actions de proximité (présentation d'une cité scolaire sans tabac, d'un programme de sensibilisation et d'accompagnement des établissements scolaires à l'arrêt du tabac, d'une action en milieu scolaire dans le Finistère)*
- *Table ronde: Comment se questionner sur sa pratique: le suivi et l'évaluation des actions de proximité (évolution du tabagisme chez les lycéens français sur*

les quatre dernières années, évaluer le développement des compétences psycho-sociales chez les 9-11 ans, présentation du programme francilien « Aujourd'hui je ne fume pas », ainsi que du programme national expérimental « Lycée pilote sans tabac »)

- Mises en perspective: le colloque a également permis d'aborder l'exemple de la prévention du tabagisme au Québec et ses apports dans nos pratiques.

### {ARTICLE}

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES)

#### **Les opticiens, acteurs de prévention contre le tabagisme**

In Actualités Tabac, n° 79, juillet-août 2007, p. 3

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu79.pdf>

*Une enquête a été menée en juin 2005 auprès d'opticiens britanniques afin de déterminer leur rôle dans la prévention du tabagisme. Le tabac est en effet un facteur de risques d'affections oculaires comme la cataracte. La « Health Education Authority » recommande depuis 1998 une intervention brève : l'opticien se renseigne sur l'éventuelle consommation tabagique du client, et l'informe des risques pour sa vue et des méthodes d'arrêt. D'après l'enquête, seuls 6,2% des opticiens interrogés interrogent leurs clients sur ce point.*

*(Thompson C et al. Attitudes of community optometrists to smoking cessation : an untapped opportunity overlooked ? Ophthalmic Physiol Opt 2007; 27:389-93. Moradi P et al. Teenagers perceptions of blindness related to smoking : novel message to a vulnerable group. Br J Ophthalmol. 2007;91:605-7)*

### {ARTICLE}

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES)

#### **BPCO : vers une détection systématique chez tous les fumeurs de plus de 40 ans**

In Actualités Tabac, n° 79, juillet-août 2007, pp. 4-5

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu79.pdf>

*La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) touche en France 6 à 8% de la population adulte. Elle peut être dépistée précocément chez le médecin généraliste à l'aide de minispiromètres. Les fumeurs de plus de 40 ans ayant une consommation de plus de paquets-années sont particulièrement concernés. La prévention de la BPCO peut d'ailleurs constituer une importante motivation à l'arrêt.*

*(Housset B. et al. Rôle du médecin généraliste dans la détection précoce de la BPCO. BEH 2007;27-28:248-250. Bednarek M. et al. Smokers with airway obstruction are more likely to quit smoking. Thorax2006;61:869-73.)*

### {ARTICLE}

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES)

#### **Tabac et plaisir : une idée fausse ?**

In Actualités Tabac, n° 79, juillet-août 2007, p. 6

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu79.pdf>

*Une enquête réalisée auprès de fumeurs britanniques de niveaux socio-économiques variés sur les liens éventuels entre tabagisme, qualité de vie ressentie et notion de plaisir n'indique pas que le fait de fumer soit relié à une idée de plaisir, au contraire, plus la consommation de tabac est importante, plus le tabagisme est associé à une qualité de vie et une notion de plaisir basses.*

*(Health Survey of England, 1991. English Longitudinal Study of Ageing, 2002. Lang I et al. Was John Reid right ? Smoking, class and pleasure : a population-based cohort study in England. Public Health 2007;121:518-24).*

**{ARTICLE}**

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES)

**Un prix élevé du tabac dissuade les fumeurs**

In Actualités Tabac, n° 79, juillet-août 2007, pp. 8-9

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu79.pdf>

*Une étude allemande vient confirmer la corrélation entre hausse des prix du tabac liée à une augmentation des taxes, et baisse de la consommation.*

*(Hanewinkel R et Isensee B. Five in a row-reactions of smokers to tobacco tax increases : population-based cross-sectional studies in Germany 2001-2006. Tobacco Control 2007;16:34-37.*

*Zellweger J.P. Diminuer la consommation de tabac : une alternative à l'arrêt de la cigarette ? Revue Médicale Suisse 2006;2:1701-1703)*

**{ARTICLE}**

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES)

**En attendant le 1<sup>er</sup> janvier 2008, « Ici c'est 100 % sans tabac »**

In Actualités Tabac, n° 80, septembre 2007, p. 6

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu80.pdf>

*La Ville de Paris et le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (Synhorcat) ont travaillé ensemble à l'élaboration d'une charte et d'un label « Ici c'est 100 % sans tabac », destiné aux établissements entièrement sans tabac, sur la base du volontariat, et ce alors que le décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics entrera en vigueur concernant les restaurants et bars à partir du 1er janvier 2008.*

*(Opération « Ici, c'est 100% sans tabac » Mairie de Paris. Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé, 94/96 quai de la Râpée - 75570, Paris Cedex 12)*

**{RAPPORT}**

Agence pour le Développement et l'Evaluation des Politiques de Santé (ADSAN)

**Evaluation du dispositif de renforcement des actions de proximité en prévention du tabagisme : dispositif emploi-jeunes tabac**, INPES, 24 janvier 2007, 118 p.

[http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/actions\\_tabac/docs/rapport\\_final.pdf](http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/actions_tabac/docs/rapport_final.pdf)

*Ce rapport de l'ADSAN fait le point sur le dispositif EJT (emploi-jeunes tabac), lancé en 2000 dans le cadre du dispositif Emploi Jeunes du gouvernement, ainsi que du Programme national de Prévention du Tabagisme 2000-2002 de la CNAMTS et du CFES.*

*Ce dispositif a touché quelques 200 jeunes, qui ont à la fois contribué à la prévention du tabagisme et au renforcement des comités d'éducation pour la santé.*

*Le rapport détaille les apports du dispositif aux politiques de prévention, ainsi que les enseignements à tirer de l'évaluation de ce programme pour d'éventuels programmes futurs.*

**{ARTICLE}**

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES)

**Tabac et cancer du sein : y aurait-il un âge d'exposition « plus à risque » ?**

In Actualités Tabac, n° 79, juillet-août 2007, p. 2

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu79.pdf>

*Le tabac constitue un facteur reconnu de risque de cancer du sein. Une étude a été menée de 1983 à 1998 sur 106 953 femmes manipulatrices en radiologie, dont 56 042 ont participé de bout en bout à l'étude en répondant aux deux questionnaires. D'après les résultats de l'enquête, l'impact du tabagisme varie avec l'âge. Les femmes jeunes, dont le tissu mammaire n'est pas encore arrivé à maturation, c'est-à-dire les adolescentes ou les jeunes adultes, ont une sensibilité accrue aux effets carcinogènes du tabac. La précocité de la première cigarette est un facteur de risque supplémentaire. (Ha M. et al. Smoking cigarettes before first childbirth and risk of breast cancer. Am J Epidemiol 2007;166:55-61)*

**{ARTICLE}**

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES)

**Le tabac in utero favorise les troubles du comportement du futur enfant**

In Actualités Tabac, n° 80, septembre 2007, pp. 4-5

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu80.pdf>

*Une étude associe le tabagisme de la mère durant sa grossesse à la survenue de troubles du comportements du futur enfant, troubles dont le risque augmenterait avec le nombre de cigarettes fumées. L'article est suivi d'un entretien avec le docteur Marie-France Le Heuzey, pédopsychiatre à l'Hôpital Robert-Debré à Paris, qui préfère parler d' « un facteur favorisant et non une cause avérée » (Gatzke-Kopp L, Beauchaine T. Direct and passive prenatal nicotine exposure and the development of externalizing psychopathology. Child Psychiatry Hum Dev 2007).*

**{ARTICLE}**

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES)

**Canada : un programme de sevrage efficace pour les femmes**

In Actualités Tabac, n° 80, septembre 2007, p. 7

<http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu80.pdf>

*Le Centre de santé pour les femmes de l'hôpital d'Ottawa met en place un nouveau programme de sevrage, fondé sur l'expérience menée par l'Institut de cardiologie de l'université d'Ottawa, qui a donné de bons résultats : 50% de bénéficiaires non fumeurs après 6 mois, 46% après un an. Les femmes concernées, une fois repérées, bénéficieront d'un plan individuel, et seront suivies par une infirmière conseil attirée au cours de leur sevrage, basé sur une attitude non-critique et le recours à des substituts nicotiniques. (www.ottawaheart.ca)*

Bulletin électronique en ligne sur [www.cresif.org](http://www.cresif.org) - Abonnement gratuit [cresif@wanadoo.fr](mailto:cresif@wanadoo.fr)

[www.cresif.org](http://www.cresif.org)  
[www.prosante-if.org](http://www.prosante-if.org)  
ressource documentaire en promotion  
de la santé Ile-de-France

Comité Régional d'Education pour la Santé d'Ile-de-France

14 rue La Fayette  
75009 Paris

Tél. : 01 48 24 38 00 / Tél. doc. : 01 48 24 38 02  
Fax : 01 48 24 38 01 / E-mail : [cresif@wanadoo.fr](mailto:cresif@wanadoo.fr)